

No utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños menores de dos años, especialmente en recién nacidos menores de un mes. | 1

No utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños menores de dos años, especialmente en recién nacidos menores de un mes.

Año: 2017

Sociedad Científica:

Áreas Clínicas:

Áreas Temáticas:

Iodine: Pediatric drug information. Lexicomp. Lexi-Comp Online™ Interaction Monograph. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2014.

Povidone iodine (topical): Drug information. Lexi-Comp Online™ Interaction Monograph. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2014.

Povidona Yodada. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

The use of topical antiseptic/antimicrobial agents in wound management. Best Practice Statement. Second edition, May 2011

Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection. Developed by the National Collaborating Centre for Women's and Children's Health. NICE clinical guideline 74- 2008

Is there significant absorption of topical iodine? and if so, how long / how much can be used?. TripAnswer. 21 February 2008

. APILAM. Betadine. En: e-lactancia.org. APILAM: Asociación para la promoción e investigación científica y cultural de la lactancia materna; 2002 actualizado 05 oct 2015; acceso 03 feb 2018.

Arena J, Emparanza JI. Los antisépticos yodados no son inocuos. An Esp Pediatr 2000; 53:25-29.

No utilizar de forma rutinaria povidona yodada en niños menores de dos años, especialmente en recién nacidos menores de un mes. | 1