

Anexo 12. Criterios MEDPED para el diagnóstico clínico de la hipercolesterolemia familiar

Criterios Dutch Lipid Clinic Network para el diagnóstico clínico de la hipercolesterolemia familiar*

Historia Familiar	Puntuación
I. Familiar de primer grado con enfermedad coronaria y/o vascular precoz	1
II. Familiar de primer grado con c-LDL \geq 210 mg/dl	1
III. Familiar de primer grado con Xantomas y/o Arco Corneal	2
IV. Niño menor de 18 años con c-LDL \geq 150 mg/dl	2
Historia Personal	
I. Antecedentes enfermedad coronaria precoz	2
II. Antecedentes de enfermedad vascular periférica o cerebral precoz (precoz= < 55 años en varones y < 60 años en mujeres)	1
Examen físico	
I. Xantomas tendinosos	6
II. Arco Corneal antes de los 45 años	4
Analítica en ayunas, con triglicéridos < 200 mg/dl	
I. c-LDL \geq 330 mg/dL	8
II. c-LDL 250-329 mg/dL	5
III. c-LDL 190-249 mg/dL	3
IV. c-LDL 155-189 mg/dL	1
Alteración funcional del gen r-LDL	8
Total de puntos	
Diagnóstico Clínico de Hipercolesterolemia Familiar: Cierto: > 8 puntos Probable: 6-7 puntos	

* Modificado por la Red Temática en investigación ISCII de Hiperlipidemias Genéticas en España de *Dutch lipid clinic network diagnosis of FH*.