

## 12. Anexos

### Anexo 1. Factores potencialmente reversibles capaces de agudizar la enfermedad renal

FACTORES	CAUSA FRECUENTE. ACTITUD
Depleción de volumen	Uso excesivo de diuréticos. Pérdidas digestivas por vómitos y diarreas.
Obstrucción	Realizar tacto rectal y ecografía. Eventualmente colocar sonda vesical o nefrostomía
Trastornos metabólicos	Los más frecuentes son: hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica, hipercalcemia.
Infecciones	Facilitadas por catéteres y sondas, que deben evitarse si no son imprescindibles. Las infecciones sistémicas, pueden comprometer el flujo sanguíneo renal y empeorar la IR.
Agentes diagnósticos nefrotóxicos	Contrastes iodados
	Gadolinio
Fármacos que deben evitarse o ajustar la dosis (los más frecuentes)	Aminoglucósidos Antiinflamatorios no esteroideos Anfotericina Citostáticos Aciclovir Inhibidores de la ciclooxigenasa 2 Digoxina Quinolonas Etambutol Metformina Sulfonilureas Glinidas iDPP4 (inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4) Agonistas GLP1 (agonistas del receptor glucagon like peptide-1) iSLGT2 (inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2 ) Insulinas

Fuente: <http://nefrologiadigital.revistanefrologia.com/publicaciones/P1-E13/Cap-16.pdf>