**Tabla 19: Recomendaciones de cribado de depresión en la infancia y la adolescencia**

| Organización | Recomendación |
|---|---|
| Europa | |
| National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (2005, 2015) (21, 82). | Los profesionales sanitarios de atención primaria deben estar familiarizados con la detección de los trastornos del estado de ánimo y debería existir un plan de acceso regular a una consulta y supervisión especializadas. Para ello recomienda el *Mood and Feelings Questionnaire*. |
| EEUU | |
| US Preventive Services Task Force (2009, 2015) (157, 160). | Recomienda el cribado de adolescentes (12 a 18 años) para el trastorno depresivo mayor en atención primaria siempre y cuando se asegure la existencia de infraestructuras que garanticen un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento. |
| American Medical Association (AMA), Guidelines for Adolescent Preventive Services (1994) (164). | Recomienda que los médicos de atención primaria empleen una estrategia sistemática de cribado, diseñado para identificar a adolescentes con riesgo de depresión o suicidio. |
| Guidelines for Adolescent Depression in Primary Care (GLAD-PC) (2007) (89). | Recomienda que los médicos de atención primaria identifiquen (vía instrumentos de cribado y entrevistas clínicas de seguimiento) y coordinen el cuidado de los adolescentes con depresión. |
| American Academy of Pediatrics (2014) (161). | Recomienda un cribado anual de riesgo de depresión en preadolescentes y adolescentes entre 11 y 21 años. |
| American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) (2007) (85). | Recomienda el cribado de depresión como parte de la evaluación psiquiátrica. |
| American Academy of Family Physicians (2009) (165). | Recomienda el cribado de adolescentes (12-18 años de edad) para depresión mayor cuando existen sistemas accesibles que garanticen el diagnóstico, tratamiento (psicoterapia) y seguimiento. |
| Canadá | |
| Canadian Task Force on Preventive Health Care (2004) (92). | Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra sobre el cribado de depresión a niños y adolescentes en atención primaria. |
| Guidelines and Protocols Advisory Committee on behalf of the Medical Services Commission (2010) (166). | Recomienda el cribado periódico de signos de depresión y ansiedad en niños y adolescentes. |

Fuente: elaboración propia a partir de Lewandowski et al. (167) y Forman- Hoffman et al. (157).