

ANEXO 12.1. Prueba - Diseño GPC con estructura multicapa y metodología GRADE

Fijo


Programa de GPC en el SNS

[Índice de Guías](#)


Variable



Guía Completa



Guía rápida



Información pacientes



Material metodológico

Título de la Guía de Práctica Clínica

es | en









Desplegar Menú

Recoger Menú

Presentación
Preguntas y Recomendaciones
Recomendaciones clave
Introducción
Alcance y objetivos
Metodología
Capítulo clínico 1 +
Capítulo clínico 2 +
Capítulo clínico 3 +
Estrategias diagnósticas y terapéuticas (algoritmos)
Difusión e implementación
Líneas de investigación futura
Actualización
Anexos
Autoría y colaboraciones

Menú que se esconde si no estás sobre él

1. Capítulo

1.1. Subcapítulo

PREGUNTA 1abierto?

Ejemplo: En los pacientes adultos, ¿se recomienda el uso de fármacos libres de conservantes frente el uso de fármacos con conservantes, para el tratamiento del glaucoma de ángulo

RECOMENDACIÓN/ES

Débil ★

Las recomendaciones deben de ser formuladas de manera estructurada (p.ej. identificando la población, intervención y comparación) con un lenguaje claro y sencillo e incluir una acción concreta. La recomendación debe de incluir la fuerza (fuerte o débil/condicional/contextual) y el lenguaje debe de ser diferente según el tipo de recomendación (se recomienda en contraposición a se sugiere).

Justificación

Justificación detallada

Resultados de la investigación

Tablas

Referencias

Vigencia de la recomendación

En la justificación el grupo elaborador de la guía debe de argumentar de manera breve las razones por la cuales han llegado a formular la recomendación. La justificación debería incluir que factores han sido los que han tenido mayor peso y de que manera han contribuido. Así mismo este texto debe clarificar las razones de la dirección y fuerza de dicha recomendación.

PREGUNTA 2

Ejemplo: En los pacientes adultos, ¿se recomienda el uso de fármacos libres de conservantes frente el uso de fármacos con conservantes, para el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto?

RECOMENDACIÓN/ES

FUERTE

Las recomendaciones deben de ser formuladas de manera estructurada (p.ej. identificando la población, intervención y comparación) con un lenguaje claro y sencillo e incluir una acción concreta. La recomendación debe de incluir la fuerza (fuerte o débil/condicional/contextual) y el lenguaje debe de ser diferente según el tipo de recomendación (se recomienda en contraposición a se sugiere).

[Previo](#) | [Siguiente](#)








Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud

Logotipo Agencia elaboradora

[Quiénes somos](#) | [Copyright](#) | [Accesibilidad](#) | [Contacto](#)