

Dolor

Diamorfina versus morfina

Resultados	Participantes (estudios) Seguimiento	Calidad de la evidencia (GRADE)	Efecto relativo (IC 95%)	Efectos absolutos	
				Riesgo con morfina	Diferencia de riesgos con diamorfina (IC 95%)
Dolor (EVA 0-100)	89 (1 estudio) 2 días	MUY BAJA ^{a,b,c} debido a riesgo de sesgo, indirectión, imprecisión	-	No informado	La media de dolor en el grupo intervención fue de 6.41 mayor (1.34 a 11.47 mayor)
Nauseas (EVA 0-100)	89 (1 estudio) 2 días	MUY BAJA ^{a,b,c} debido a riesgo de sesgo, indirectión, imprecisión	-	No informado	La media de náuseas en el grupo intervención fue de 2.36 mayor (1.04 menor a 5.77 mayor)
Calidad de sueño nocturno (EVA 0-100)	89 (1 estudio) 2 días	MUY BAJA ^{a,b,c} debido a riesgo de sesgo, indirectión, imprecisión	-	No informado	La media de calidad de sueño nocturno en el grupo intervención fue de 7.77 menor (15.89 menor a 0.34 mayor)

(a) Se disminuyó 1 punto si se identificó alto riesgo de sesgo o en 2 puntos si se identificó riesgo de sesgo muy alto (los estudios observacionales comienzan desde bajo).

(b) Se disminuyó 1 punto si la mayoría de la evidencia provenía de estudios con una indirecta seria o en 2 incrementos si la mayoría de la evidencia provenía de estudios con una indirecta muy seria.

(c) Se disminuyó en 1 punto si el intervalo de confianza cruzó 1 MID o en 2 puntos si el intervalo de confianza cruzó ambos MID.