

Anexo 4. Abreviaturas

ACU	Análisis coste utilidad
ADCS-CGIC	<i>Alzheimer's Disease Cooperative Study – Clinical's Global Impression of Change</i>
AGREE	<i>Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation</i>
AIMS	<i>Abnormal involuntary movements scale</i>
ATC	Antidepresivos tricíclicos
AVAC	Años de vida ajustados por calidad
BDI	<i>Beck Depression Inventory</i>
BPRS	<i>Brief Psychiatric Rating Scale</i>
CDR	Cantidad diaria recomendada
CDSR	<i>Cochrane Database of Systematic Reviews</i>
CGI	<i>Clinical Global Impression</i>
COMPASS-OD	<i>Composite Autonomic Symptom Scale, orthostatic domain</i>
CVRS	Calidad de vida relacionada con la salud
DAP	Disposición a pagar
dB	Decibelio
DE	Desviación estándar
D-KEFS	<i>Verbal fluency test form the Delis-Kaplan Executive Function System test battery</i>
DMP	Diferencia medias ponderada
ECA	Ensayo controlado aleatorizado
EGTS	Escala general de trastornos del sueño
EMA	Agencia Europea de Medicamentos
EP	Enfermedad de Parkinson
ERP	Ejercicios de resistencia progresiva
ESE	Escala subjetiva de somnolencia de Epworth
EQ-5D	Escala de calidad de vida compuesta por 5 dimensiones
EVA	Escala visual analógica
FEPP	Federación española de Parkinson

FOG-Q	<i>Freezing of Gait Questionnaire</i>
GPC	Guía de práctica clínica
HO	Hipotensión ortostática
Hz	Hertzio
IC95%	Intervalo de confianza al 95%
IMC	Índice de masa corporal
ISRS	Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
LCIG	<i>Levodopa-carbidopa intestinal gel</i>
L-dopa	Levodopa (enantiómero L -levógiro- activo)
LSVT	<i>Lee Silverman Voice Treatment</i>
m	Metro
MADRS	<i>Montgomery-Asberg Depression Rating Scale</i>
mFC	<i>Modified Fitness Counts</i>
MMSE	<i>Mini-Mental State Examination</i>
NEADL	<i>Nottingham Extended ADL</i>
NHS	Servicio nacional de salud británico
NICE	<i>National Institute for Health and Care Excellence</i>
NPI	<i>Neuropsychiatric inventory</i>
NS	No significativo
NUDS	<i>Northwestern University Disability Scale</i>
OR	Odds ratio
PDQ-39	<i>Parkinson's Disease Questionnaire</i>
PEDro	<i>Physiotherapy Evidence Database.</i>
PEG	Polietilenglicol
REM	<i>Rapid eye movement</i>
RIII	Reflejo nociceptivo de flexión
RR	Riesgo relativo
RRSS	Revisiones sistemáticas
RS	Revisión sistemática
SDE	Somnolencia diurna excesiva
SF-36	<i>Short-Form Health Survey</i> con 36-ítems
SIGN	<i>Scottish Intercollegiate Guidelines Network</i>

SIP-68	<i>Sickness Impact Profile</i> con 68 ítems
SNA	Sistema Nervioso Autónomo
SNC	Sistema Nervioso Central
SNS	Sistema Nacional de Salud
SPI	Síndrome de piernas inquietas
TA	Tensión arterial
TCI	Trastornos del control de impulsos
TO	Terapia ocupacional
TRD	Terapia de reposición dopaminérgica
TRI	Tratamiento de rehabilitación intensiva
UI	Unidades internacionales
UPDRS	<i>Unified Parkinson's Disease Rating Scale</i>
VAST	Terapia de deglución asistida por vídeo
VCC	Vibración de cuerpo completo

Han transcurrido más de 5 años desde la publicación de esta Guía de Práctica Clínica y está pendiente su actualización.