

Tabla 10. Sensibilidad (porcentajes) a los principales antibióticos de *E. coli* más frecuentes en series pediátricas y series de población general nacionales

Autor Año	Periodo tiempo	Porcentaje de sensibilidad a antibióticos												Muestra	
		AMP	AMC	C1G	C2G	C3G	NIT	GM	TM-SMX	NAL	FF	CIP	Tipo	Origen	
Díaz-Díaz 1993	1992-1993	39,4	90,6	57,5	99,4	100	—	100	61,9	—	—	c	Gijón		
Martínez 2001	1995-1999	49	—	92	97	100	95	96	82	—	—	c	Oviedo		
Hernández 2001	1995-2000	20	85	80	95	99	90	95	65	—	99	c	Comunidad Valenciana		
Ochoa 2004	1995-2001	36,7	93,3	95	99,3	100	94,4	96,6	77,3	—	100	c	Zamora		
Andreu 2005	2002	41,3	90,8	—	—	95,8	94,3	—	66,1	—	98	77	b *	España	
Andreu 2008 ⁶⁴	2008														
		39,3	91,9		91,1	93,1	96,2		68	65,5	98,3	76,1	b *	Total (España)	
		34,9	91,5		80,1	79,7	96,1		62,7	61,5	99,2	74,5	b *	Andalucía	
		32,7	93,2		93,2	95,2	93,1		63,3	59,2	98,6	74,8	b *	Aragón	
		27,9	81,7		78,6	90,8	87		72,5	73,2	99,2	71	b *	Asturias	
		41,9	94,9		93,7	100	96,2		68,6	65,5	95,6	79,4	b *	Castilla y León	
		36,5	89,3		97,6	98,9	98,4		70,3	71,8	98,2	84,7	b *	Cataluña	
		41,8	94,3		88	91,1	95,9		65,7	60,9	97,4	68,4	b *	Madrid	
		36,3	89,7		89,7	89	95,9		63,7	50,7	98,5	62,7	b *	Comunidad Valenciana	
		63,2	95,6		98,5	98,5	98,5		75	80,1	99,3	87,5	b *	Galicia	
		50,6	97		95,9	98,2	100		77	72,3	99,4	87,1	b *	País Vasco	
Caro Narros 2007 ⁶⁵	2007													Segovia	
		42,9	88,7	82,4	91,4	96	90,6	90,5	69,3	63,8	94,1	76,6	b *	Total	
		37,2	87,6	81	89,7	93,1	88,9	89,3	68,4	61,6	93	74	*	Hospital	
		42,4	89,3	83,3	92,4	95,7	91,6	91,2	69,8	65,1	94,7	78,2	*	Ambulatorio	
Fernández Díaz 2008 ⁶⁶													c	Gijón	
	1996-2006	43,9	98,8	78,8	96,3	97,6		97,6	80,5						
	1996-2001	44,7	84,2	53,3	83,3	91,7		91,7	80						
	2001-2006	38,8	92,5	75,4	85,5	91		94	74,2						
Lorente Garín 2005 ⁶⁶	1997-2001	38,2	89,5	94,4			92,9		68,8		99,1	70,9	a *	Barcelona	
Pardo 2008 ⁶⁷	2006	39,8	95,3	97,2		98,1	99,1	99	79,6		98,6	96,7	b	Gijón	
Rodríguez López 2005 ⁶⁸	1992-2003	35,6	94,3	91,7	94	98,6	91,9	91,2	64,1	65,7	98,6	78	b *	Córdoba	
	2003		92		91	95	96	93	64	59	98	72	b *		
Tena 2010 ⁷⁰	2003-2007 ⁷¹	37,7	86,7		87,3	96,2	96,2	92,4	67,3	60,5	97,6	75,4	b *	Castilla-La Mancha	
	2007	35,7	85,7		86,1	94,7	96	91,4	66	59,8	95,5	72,3	b *		

AMC: amoxi-clavulánico; AMP: ampicilina; C1G, C2G, C3G: cefalosporina de 1^a, 2^a y 3^a generación; CIP: ciprofloxacino; GM: gentamicina; FF: fosfomicina; NAL: ac nalidixíco; NIT: nitrofurantoína; TM-SMX: trimetoprima-sulfametoaxazol.

a: ITU en pacientes extrahospitalarios; b: ITU pacientes hospitalizados y extrahospitalarios; c: ITU en pacientes hospitalizados; *Población general.

Tabla adaptada de Eiros Bouza et al. (2007)²

Han transcurrido más de dos años desde la publicación de esta Guía de Práctica Clínica y es necesario su actualización.