

Tabla 11. Sensibilidad a los principales antibióticos de *Proteus spp.* en distintas series

Autor Año	Periodo tiempo	Porcentaje de sensibilidad a antibióticos												Muestra	Origen
		AMP	AMC	C1G	C2G	C3G	NIT	GM	TMP-SMX	NAL	FF	CIP	Tipo		
Díaz-Díaz 1993	1992-1993	50	96,7	86,7	93,3	96,7	—	100	56,7	—	—	c	Gijón		
Martínez 2001	1995-1999	75	—	100	100	100	100	100	86	—	86	c	Oviedo		
Hernández 2001	1995-2000	40	40	80	90	95	25	85	60	—	—	c	Comunidad Valenciana		
Ochoa 2004	1995-2001	60,5	100	93	100	100	0	100	74,4	—	83	c	Zamora		
Andreu 2005	2002	61,6	93,9	—	—	96,4	0	—	62,1	—	76	83	b *	España	
Lorente Garín 2005 ⁶⁶	1997-2001	56,6	92,9	98,4	—	—	1,2	—	61,9	—	84,4	78	a *	Barcelona	
Pardo 2008 ⁶⁷	2006	60,5	100	90,7	—	100	9,3	90,2	69,8	—	92,2	97,6	b	Gijón	
Rodríguez López 2005 ⁶⁸	1992-2003	54,4	95,3	89,6	98,5	100	14,3	90,2	53,2	84,2	89,7	91,5	b *	Córdoba	
	2003	—	97	—	97	100	—	91	49	81	88	94	b *		

AMC: amoxi-clavulánico; AMP: ampicilina; C1G, C2G, C3G: cefalosporina de 1^a, 2^a y 3^a generación; CIP: ciprofloxacino; GM: gentamicina;

FF: fosfomicina; NAL: ac.nalidíxico; NIT: nitrofurantoína; TM-SMX: trimetoprima-sulfametoxazol.

a: ITU en pacientes extrahospitalarios; b: ITU pacientes hospitalizados y extrahospitalarios; c: ITU en pacientes hospitalizados; *Población general.

Tabla adaptada de Eiros Bouza et al. (2007)²

Tabla 12. Sensibilidad a los principales antibióticos de *Klebsiella spp.* en distintas series

Autor Año	Periodo tiempo	Porcentaje de sensibilidad a antibióticos												Muestra	Origen
		AMP	AMC	C1G	C2G	C3G	NIT	GM	TMP-SMX	NAL	FF	CIP	Tipo		
Martínez 2001	1995-1999	—	—	—	77	50	50	50	47	—	37	—	c	Oviedo	
Hernández 2001	1995-2000	0	0	75	85	100	60	90	75	—	—	—	c	Comunidad Valenciana	
Ochoa 2004	1995-2001	—	90,9	72,7	86,4	95,5	90	95,5	100	—	88	—	c	Zamora	
Andreu 2005	2002	0	94,5	—	—	97,7	67,1	—	93,2	—	78	93	b *	España	
Lorente Garín 2005 ⁶⁶	1997-2001	0	90,8	97,4	—	—	59,3	—	93,8	—	91,1	89,1	a *	Barcelona	
Pardo 2008 ⁶⁷	2006	60,5	100	90,7	—	100	9,3	90,2	69,8	—	92,2	97,6	b	Gijón	
Rodríguez López 2005 ⁶⁸	1992-2003	—	95,5	93,5	94	100	76	98	94,2	90	81,8	94	b *	Córdoba	
	2003	—	89	—	86	100	84	95	89	91	72	94	b *		

AMC: amoxi-clavulánico; AMP: ampicilina; C1G, C2G, C3G: cefalosporina de 1^a, 2^a y 3^a generación; CIP: ciprofloxacino; GM: gentamicina;

FF: fosfomicina; NAL: ac.nalidíxico; NIT: nitrofurantoína; TM-SMX: trimetoprima-sulfametoxazol.

a: ITU en pacientes extrahospitalarios; b: ITU pacientes hospitalizados y extrahospitalarios; c: ITU en pacientes hospitalizados; *Población general.

Tabla adaptada de Eiros Bouza et al. (2007)²