

Pasiflora

Pregunta: Pasiflora comparado con Oxacepam en TAG

Evaluación de certeza							Nº de pacientes		Efecto		Certeza	Importancia
Nº de estudios	Diseño de estudio	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Pasiflora	Oxacepam	Relativo (95% CI)	Absoluto (95% CI)		

Síntomas de ansiedad (seguimiento: media 4 semanas; evaluado con : HAMA)

1 ¹	ensayos aleatorios	muy serio ^a	no es serio	no es serio	serio ^b	ninguno	El tratamiento con Passiflora incarnata (Línea base = 19,6±5,1; Post-tratamiento = 5,7±5,1) y el Oxazepam (Línea base = 19,8±5,1; Post-tratamiento = 5,2±5,1) mostraron una disminución similar de los síntomas de ansiedad en las puntuaciones obtenidas en la escala HAMA.	⊕○○○ Muy baja	CRÍTICO
----------------	--------------------	------------------------	-------------	-------------	--------------------	---------	--	------------------	---------

CI: Intervalo de confianza

Explicaciones

a. Sesgo en la selección de resultados informados.

b. El número de pacientes incluidos en la revisión es menor que el TOI (348 participantes en cada grupo) y/o el IC95% cruza el umbral de decisión.

Referencias

1.Akhondzadeh, S, Naghavi, H., Vazirian, M., Shayeganpour, A., Rashidi, H., Khani, M. Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J. Clin. Pharm. Ther.; 2001.