

## TABLA DE SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA o PERFILES DE EVIDENCIA GRADE

**Comparación:** Pacientes con ictus hemorrágico (diagnosticado tras inicio de antiagregante)

**Bibliografía:** Chen et al, 2000 (RS)

Evaluación de la calidad							Nº de pacientes		Efecto		Calidad	Importancia
Nº de estudios	Diseño de estudio	Riesgo de sesgo	Inconsistencia	Evidencia indirecta	Imprecisión	Otras consideraciones	Inicio con aspirina	Control	Relativo (95% CI)	Absoluto (95% CI)		
<b>Desenlace 1: Recurrencia de ictus o mortalidad</b>												
2	ECA	Serio <sup>1</sup>	No seria	No seria	Seria <sup>2</sup>	Ninguna	63/398 (16%)	67/ 375 (18%)	RR 0,89 (0,65 a 1,21)	-	⊕⊕○○ BAJA	CRITICA
<b>Desenlace 2; Mortalidad (por cualquier causa)</b>												
2	ECA	Serio <sup>1</sup>	No seria	No seria	Seria <sup>2</sup>	Ninguna	44/398 (11,1%)	44/375 (11,7%)	RR 0,94 (0,64 a 1,4)	-	⊕⊕○○ BAJA	CRITICA
<b>Desenlace 2; Otro ictus hemorrágico</b>												
2	ECA	Serio <sup>1</sup>	No seria	No seria	Seria <sup>2</sup>	Ninguna	29/398 (7,3%)	26/375 (6,9%)	RR 1,05 (0,63 a 1,75)	-	⊕⊕○○ BAJA	CRITICA
<b>Desenlace 3: Otro ictus de cualquier tipo</b>												
2	ECA	Serio <sup>1</sup>	No seria	No seria	Seria <sup>2</sup>	Ninguna	1/ 398 (0,25%)	8/ 375 (2,1%)	OR 0,12 (0,01 a 0,93)	-	⊕⊕○○ BAJA	CRITICA

<sup>1</sup> Se trata de un subanálisis de los datos de ambos estudios, por lo que puede haber riesgo de sesgos; <sup>2</sup> Hay pocos eventos